

# Organización social y comunicación en *Apis mellifera*



# Organización social y comunicación en *Apis mellifera*




# Organización Social

## Insectos Eusociales

- **División del trabajo (por edad)**
- **Castas estériles**
- **Varias generaciones simultáneas**
- **Cooperación en cuidado de la cría**

# Castas



**Obrera**

**Reina**

**Zángano**

# Zángano



- Fertilizan a la reina en el vuelo nupcial
- Expulsados de la colmena en otoño



# Reina



- Única hembra fértil
- Se apareja una sola vez en su vida
- Produce hasta 1.500 huevos/día
- Vive 2 a 5 años


# Obrera



- hembra “estéril”
- A cargo del mantenimiento de la colonia
- Vive entre 40 días (verano) o 4/5 meses (invierno)

# Desarrollo

## Insecto Holometábolo



Puesta  
(reina)

Alimentación  
(obrero)

Crecimiento

Cierre (obrero)

Metamorfosis


Eclosión




# Desarrollo




# Desarrollo




# Anatomía Externa



# Anatomía: proboscis




# Anatomía Interna







# Anatomía Interna



# Anatomía: aparato digestivo




# Anatomía: glándulas



# Anatomía: Cerebro


**Lóbulos  
ópticos**



**Lóbulos olfatorios**

**Cuerpos  
pedunculados**

# Anatomía: Cerebro






# División del trabajo

- **Entre obreras**
- **Basado en edad de la obrera y requerimientos de la colonia**


# División del trabajo

Obreras jóvenes ( $\leq 10/15$  días)

Limpieza de celdas



Alimentar crías




Cuidado de reina




# División del trabajo

## Obreras mediana edad ( $\leq 15/30$ días)

Construir celdas



Control de temperatura




Recibir y procesar  
pólen y néctar




# División del trabajo

Obreras avanzada edad ( $\leq 30/45$  días)

Defensa colmena




Scouting



Recolección de  
pólen y néctar




# División del trabajo







# Recolección de alimento



# Navegación


## Luz Polarizada




# Navegación




# Navegación



# Navegación




**Zenit**




**Ocaso**



# Navegación




# Comunicación: Danza




# Comunicación: Danza

- Modulable por la distancia y la dirección de la fuente






# Comunicación: Danza



**Dirección**



**Distancia**


# Recolección de alimento: características

- Recolector de lugar central
- Ciclos alternados de carga y descarga de alimento

Fuente



(Carga)



Colmena




(Descarga)


# Recolección de alimento: carga

**Modulado por distintas variables de la fuente:**


- Distancia a la colmena
- Concentración de azúcares
- **Flujo de entrega**








- Comportamiento de carga **compromiso** entre requerimientos **energéticos** e **informacionales**.



- El intercambio de información permitiría un mejor aprovechamiento **social** de las fuentes.


# Comunicación: Trofalaxia

- Transmisión boca a boca del líquido
- Una o más receptoras




**Carga**  
**(en la floración)**

**Descarga**  
**(en la colmena)**



## Correlación entre flujo de entrega de la fuente y velocidad de transferencia






# Alta Productividad



- alta carga
- poco tiempo


rápido  
retorno






rápida  
descarga



## Productividad




- carga
- tiempo



descarga

# Metodología

## Fuente




Tiempo  
de visita

Flujo

Carga de buche

## Arena Experimental



- *Tiempo de Contacto*
- *Volumen intercambiado*

**Tasa de transferencia**

# Influencia de la carga de buche


- Carga constante (60  $\mu\text{l}$ )
- 3 grupos:
  - 16.5  $\mu\text{l}/\text{min}$
  - 33.5  $\mu\text{l}/\text{min}$
  - 65  $\mu\text{l}/\text{min}$

Posibilidades:


Carga constante ☆1) tasa constante

☆ 2) tasa variable

# Carga de buche




# Tiempo de Visita






# Tasa de transferencia




# Productividad




# Sensibilidad a cambios de flujo *dentro* de una visita de recolección


- **Serie Base:**
  - 10 µl/min (5 visitas)
  - 20 µl/min
  - 60 µl/min
- **Serie *60+10***
- **Serie *10+60***


# Serie 60+10






# Serie 10+60







# Tasa de transferencia




# Conclusión

- Sensible a cambios de flujo *dentro* de una visita.
- *Decrementos* perceptualmente *más importantes* que incrementos.

sin embargo...

...¿modulación *independiente* del *tiempo*?


# Dinámica de la recolección




# La medición de tiempo durante la visita de forrajeo


- **Serie Base:**
  - 20  $\mu\text{l}/\text{min}$  (5 visitas)
  - 60  $\mu\text{l}/\text{min}$
- Serie *Demora*
- Serie *Interrupción*
- Serie *Retención*

# Serie *Demora*







# Serie *Interrupción*









# Serie *Retención*





# Tasa de transferencia



# Conclusión

- **Momento** de manipulación en la fuente afecta la velocidad de transferencia.
- Sólo **iniciada** la ingestión.

Evaluación de productividad  
**comienza al ingerir**

- (Varjú & Núñez 1991)

# **Series *Interrupción y Demora***

**al iniciar la ingestión...**

- **¿perturbación por manipulación inesperada?**
- **¿medición del tiempo?**

# Efecto del Entrenamiento

- Si perturbación por manipulación **inesperada...**


..¿puede **eliminarse** con entrenamiento?




# Series

- **Serie Base**
  - 15  $\mu\text{l}/\text{min}$
  - 60  $\mu\text{l}/\text{min}$
- Serie “**Cambio *Inesperado***”
- Serie “**Cambio *Esperado***”


# Serie “Cambio *Inesperado*”



# Serie “Cambio *Esperado*”



# Tasa de transferencia



# Conclusión

- No es por cambio **inesperado...**

¿Siempre hay perturbación?

¿mide el tiempo?

¿integra “**flujo medio**”?

# Flujo medio = *Carga/Tiempo*

- Cambio Esperado e Inesperado:

60  $\mu\text{l}/\text{min}$    sin/sol.   60  $\mu\text{l}/\text{min}$    65  $\mu\text{l}$



4 minutos



65  $\mu\text{l}$

4 min

**16.25  $\mu\text{l}/\text{min}$**

**Interrupción**

**60  $\mu\text{l}/\text{min}$**

**sin/sol.**

**60  $\mu\text{l}/\text{min}$**


**65  $\mu\text{l}$**

**3 minutos**

**21.67  $\mu\text{l}/\text{min}$**

65  $\mu\text{l}$   
**3 min**





# Evidencias previas por “*flujo medio*”

- Varjú & Núñez (1991)
- Greggers et al. (1993)
- Fülöp & Menzel (2000)

- **Raveret-Richter y Waddington (1993)**
- **De Marco y Farina (2001)**
- **Danza y trofalaxia como indicadores de productividad:**

**Influye la **experiencia previa**.**


**Modulación de la tasa de transferencia :**

- **¿Influye la experiencia previa?**


# Efecto de la Experiencia Previa

- **Serie Base**
  - 5  $\mu\text{l}/\text{min}$
  - 15  $\mu\text{l}/\text{min}$
  - 60  $\mu\text{l}/\text{min}$
- Serie ***“Aumento”***
- Serie ***“Decremento”***


# Serie “*Aumento*”



# Serie “*Decremento*”



# Tasa de transferencia



# Conclusión


- Existe **influencia** de la **experiencia** **previa**.

**sin embargo...**




...¿Decrementos perceptualmente **menos** importantes que incrementos?!!!

(Opuesto a series  $10+60$  y  $60+10$ )




- Cambio **entre** visitas (no **en** visita).
- Diferencias genéticas (Page et al.).
- Diferencias en condiciones ambientales e internas.



# ¿Valor funcional?

1. **Acelerar la descarga**
2. **Acelerar el procesamiento de néctar**
3. **Transmisión de información (otras recolectoras)**





¡Espero  
que les  
haya  
gustado!